

Welche Mittel können eingesetzt werden?

Mittel	Anwendungsgebiet	Aufwandmenge l/ha	Anwendungen Anzahl	Wartezeit (Tage)	Besondere Hinweise
Reglone	Pflanzkartoffeln	5,0	1	10	In sehr dichten Beständen Reglone im Splitting (2×2,5 l/ha im Abstand von 3–5 Tagen) anwenden. Wasseraufwand mindestens 600 l/ha.
	Pflanzkartoffeln	2,5	2	10	Bei schwierig abzutötenden Beständen hat sich die Spritzfolge mit Reglone 1,5 l/ha (Öffnen des Blattdaches), 1 Woche später mit Quickdown + Toil (0,8 + 2,0) und ggf. bei hoher Gefahr mit Wiederaustrieb wiederum eine Woche später, jedoch spätestens bei sichtbarem Wiederaustrieb mit Shark 1,0 l/ha bewährt.
	Konsumkartoffeln	2,5	1	10	Nicht in welken Beständen bzw. bei extremer Trockenheit einsetzen.
Shark	Konsumkartoffeln Pflanzkartoffeln	1,0	1	14	Vor dem Einsatz Bestände schlegeln oder das Blattdach mit Reglone öffnen. Ausreichende Wirkung der Vorbehandlung abwarten (7–10 Tage).
Quickdown + Toil	Konsumkartoffeln Pflanzkartoffeln	0,8+2,0	2	F	Solobehandlung nur in schwachwüchsigen und weit in der Abreifephase befindlichen Sorten. Optimaler Einsatz bei Sonnenschein und geöffnetem Blattdach (>50 %). Öffnen des Blattdachs durch Schlegeln oder Vorbehandlung mit Reglone. Einsatzzeitpunkt bis 14 Tage vor der Ernte!

Bemerkungen: F = Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen abgedeckt und daher eine Festsetzung in Tagen nicht erforderlich. Der Behandlungszeitpunkt liegt allerdings spätestens 14 Tage vor der Ernte.