Rapssorten im Landessortenversuch: Eigenschaften und Relativerträge

Sorte[3]	Zulassung[1]	agronomische Eigenschaften[1]				Ertrags-eigenschaften[1]			vorläufige Relativerträge LSV Baden-Württemberg – ein- und mehrjährig[4]			
		Reifeverzögerung des Strohs	Reife	Pflanzenlänge	Standfestigkeit	Kornertrag	Ölertrag	Ölgehalt	2017 (dt/ha)	2017 (%)	2013–2017 (dt/ha)	2013–2017 (%)
Alvaro KWS EU	2015	g/m	m	m/l	h	h/sh	h	m/h	54,7	101,4	60,2	102,8
Arazzo EU	–	m	fr/m	m	h	sh	sh	m/h	57,0	105,7	60,4	103,1
Archipel	2014	m	m	m	m/h	h/sh	h	h	50,0	92,8	54,7	93,6
Armstrong EU	2013	–	m	m	h	h	h	h/sh	52,0	96,5	57,0	97,4
Asterion	2016	g	m	m	h	h/sh	h/sh	h	54,2	100,5	58,8	100,4[5]
Attletick EU	2013	m	m	m	h	h/sh	h/sh	m/h	55,3	102,6	60,6	103,5
Avatar	2011	m/h	fr/m	m	h	h/sh	h/sh	h/sh	54,4	100,9	57,4	97,9
Bender	2015	g	m	m	h	sh	sh	sh	55,3	102,5	60,2	102,8
Comfort	2013	m	m	m	h	h/sh	h/sh	h/sh	55,4	102,7	58,5	99,8
DK Exstorm EU	2011	–	m	m/l	m/h	h/sh	h	h	53,5	99,2	58,7	100,3
Fencer	2014	g/m	m	m	h	h/sh	h/sh	h	53,7	99,7	57,9	98,8
Hattrick	2016	m/h	m	m	h	sh	sh	h/sh	54,8	101,7	59,6	101,8[5]
Medea	2013	m	m	m	h	h/sh	h	m/h	52,1	96,6	56,8	97,0
Mercedes	2013	m/h	m	m	h	h/sh	h	h/sh	50,5	93,7	56,1	95,8
Nimbus	2015	g/m	m	m	h	sh	h/sh	m/h	57,5	106,6	62,1	106,0
Penn	2014	m	m	m	h	sh	h/sh	h	53,4	99,0	58,1	99,2
PR 46 W 26 EU	2009	m	m	m	h	h	h	h/sh	52,3	97,0	57,4	98,0
Raffiness	2014	m	m	m	h	h/sh	h/sh	h/sh	52,1	96,6	57,1	97,5
Tonka	2015	g/m	m	m	h	h/sh	h/sh	sh	55,5	102,8	59,3	101,2[5]
Trezzor[2] EU	–	–	–	–	–	–	–	–	54,8	101,6	60,4	103,1[5]
LSV-Ergebnisse 2017 bzw. 2013–2017									**54,0**	**100,0**	**58,6**	**100,0**

[1] Quelle: Beschreibende Sortenliste 2017, geändert; Reifeverzögerung des Strohs: g=gering; m=mittel; st=stark; Reife: fr=früh; m=mittel; sp=spät; Pflanzenlänge: k=kurz; m=mittel; l=lang; Standfestigkeit, Ertrags- und Qualitätseigenschaften: m=mittel; h=hoch; sh=sehr hoch; EU=EU-Sorte; sonstige Abkürzungen: – = keine Angabe; [2] keine Beschreibung in der BSL; [3] orthogonale Sorten: an allen LSV-Standorten geprüfte Sorten; [4] LSV-Standorte BW 2016/17: Döggingen, Neuenstein, Tailfingen, Boxberg, Krauchenwies, Eiselau (Versuch wurde abgebrochen); [5] weniger als 10 Versuche