

Tabelle 1: Bekämpfungsrichtwerte für Rapsschädlinge*

Schädling	Kontrolltermin	Art der Kontrolle	Bekämpfungsschwellenwert
Großer Rapsstängelrüssler	ab Anfang Februar/ Anfang März bei Bodenerwärmung	Gelbschalenfang	10 Käfer/Gelbschale in 3 Tagen
Gefleckter Kohltriebrüssler			30 Käfer/Gelbschale in 3 Tagen
Rapsglanzkäfer	ab Knospenbildung bis Blühbeginn	Abklopfen der Blüten- büschel (Haupttrieb), Zählen der Käfer	Schwacher Bestand: bis BBCH 55: > 4 Käfer BBCH 55–59: > 5 Käfer Wüchsiger Bestand: bis BBCH 55: > 8 Käfer BBCH 55–59: > 10 Käfer
Kohlschotenrüssler	Blüte (BBCH 61–65)	Abklopfen der Blütenbüschel in eine Schale, Zählen der Käfer	1 Käfer/Pflanze
Kohlschotenrüssler und Kohlschotenmücke	Blüte (BBCH 61–65)	Beobachten und Zählen der Käfer und Mücken, Beobachtung am Feldrand	1 Käfer/2 Pflanzen und 1 Mücke/4 Pflanzen

* Rapsentwicklungsstadien BBCH 55 = einzelne Blütenknospen des Haupttriebes sichtbar, BBCH 59 = erste Blütenblätter sichtbar, Blüten noch geschlossen, BBCH 61–65 = Vollblüte