

Schneckenkornpräparate – nur Nasspressungen – in Raps und Getreide*

Mittel (Beispiele)	Wirkstoff Wirkstoff- gehalt	Kultur	Aufwand- menge kg/ha ¹	Körner pro m ² (ca.)	Anwendungshinweise ²
Metarex Inov	Metaldehyd 40 g/kg	Raps	5	30	Nach der Saat bis 7. Laubblatt entfaltet (BBCH 17) ³
		Getreide	5		Nach der Saat bis zum Ende des Bestockens (BBCH 29) ³
Delicia-Schnecken-Linsen MolluStop Patrol MetaPads G2	Metaldehyd 30 g/kg	Raps	3	33	Ab der Saat bis Beginn des Längenwachstums (BBCH 30)
		Getreide	3		Ab der Saat bis zum Ende des Bestockens (BBCH 29)
Limares Techno	Metaldehyd 50 g/kg	Raps	7	30	Nach der Saat bis bis zur Entwicklung von 9 oder mehr Seitensprossen (BBCH 29)
		Getreide	7		Nach der Saat bis zum Ende des Bestockens (BBCH 29)
Arinex	Metaldehyd 60 g/kg	Raps	6	40	vom Auflaufen bis 9 oder mehr Laub- blätter entfaltet sind (BBCH 19)
		Getreide	6		Nach dem Auflaufen bis zum Ende des Bestockens (BBCH 30)
Derrex	Eisen-III- phosphat 29,7 g/kg	Ackerbau- kulturen	7	55	Bei Befallsbeginn/Sichtbar- werden der ersten Symptome, max. 4 Anwendungen
Sluxx ^{HP}	Eisen-III- phosphat 29,7 g/kg	Ackerbau- kulturen	7	60	Bei Befallsbeginn/Sichtbar- werden der ersten Symptome, max. 4 Anwendungen

* Stand August 2017 (Auswahl); ¹ Aufwandmenge für Flächenbehandlung.

² Wenn keine andere Angabe vermerkt ist, dürfen die Mittel im zugelassenen Zeitraum max. 2x angewendet werden.

Die jeweiligen Anwendungsbestimmungen und Auflagen der Mittel sind zu beachten.

³ Max. 5 Anwendungen in der Kultur je Jahr. Max. Mittelaufwand 17,5 kg/ha pro Jahr (entsprechend 700 g Wirkstoff/ha pro Jahr).