

# Beizmittel für Sommergetreide

Mittel (Beispiele)	Wirkstoffe	Wirkungsbereich (Aufwandmenge in ml/dt Saatgut)						
		Weizen			Gerste			Hafer
		Stein- brand	Flug- brand	Schnee- schimmel	Streifen- krankheit	Flug- brand	Netz- flecken	Flug- brand
Cedomon	Pseudomonas chlororaphis	–	–	–	750	–	750	–
Cerall	Pseudomonas chlororaphis	1000	–	1000 <sup>3</sup>	–	–	–	–
Arena C + Formel M	Fludioxonil Tebuconazol	200	200	200	–	–	–	–
Baytan 3	Fluopyram Prothioconazol Triadimenol	–	–	–	200	200	200	–
Celest Formel M	Fludioxonil	200	–	200	–	–	–	–
Difend Extra	Difenoconazol Fludioxonil	200	–	200 <sup>3</sup>	–	–	–	–
EfA	Fluoxastrobin Prothioconazol Tebuconazol Triazoxid	160 <sup>1</sup>	160 <sup>1</sup>	160 <sup>1</sup>	160	160	–	100
Landor CT Formel M	Difenoconazol Fludioxonil Tebuconazol	200	200	200	200	200	–	–
Orius Universal	Prochloraz Tebuconazol	200	200	200	200	200	–	150
Rubin TT	Prochloraz Pyrimethanil Triticonazol	200 <sup>1</sup>	200 <sup>1</sup>	200 <sup>1</sup>	200	200	–	150
Zardex G	Cyproconazol Imazalil	–	–	–	250 <sup>2</sup>	250 <sup>2</sup>	–	200

<sup>1</sup> Nicht in Sommerhartweizen; <sup>2</sup> Verringerte Aufwandmenge nach Firmenempfehlung;

<sup>3</sup> Nur gegen Fusarium-Arten zugelassen